

### 沖縄病院 化学療法レジメン登録票

Atezolizumab(day1)+CBDCA(day1)+nab-PTX(day1,8,15) 3週毎

療法

☆投与スケジュール									
※医薬品名・投与量・ルート・時間等を記載。前投薬や輸液なども投与順に具体的に記述する									
Day1と8で投与スケジュールが異なる、Day2, 3のHydrationがあるなど複数日に渡る場合は各々記載する									
【Day1】									
投与順	血管外漏出リスク	薬品名(一般名)	投与量	単位	投与経路	ルート	時間	速度	薬剤毎の注意点
①		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	15分		フィルター付きラインを使用。アプレピタントドDay1~3内服
②	非壊死性	アテゾリズマブ 大塚生食注 250mL	1200 1	mg/body 瓶	点滴	メイン	60分		2回目以降30分に短縮可能
③		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	15分		
④		グラニセトロンバッグ 3mg デキサメタゾン 1.65mg	1 3	袋 管	点滴	メイン	15分		ルートを交換(フィルターなしへ)
⑤		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	10分		フィルターなしを確認
⑥	壊死起因性	パクリタキセル(アルブミン懸濁型) 大塚生食注 50mL	100 1	mg/m <sup>2</sup> 瓶	点滴	メイン	30分		
⑦		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	10分		
⑧	炎症性	カルボプラチン 大塚生食注 250mL	6 1	AUC 袋	点滴	メイン	90分		
⑨		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	15分		
⑩		生食注シリンジ「NP」 10mL	1	筒	生食ロック	メイン			
【Day8,15】									
投与順	血管外漏出リスク	薬品名(一般名)	投与量	単位	投与経路	ルート	時間	速度	薬剤毎の注意点
①		デキサメタゾン 1.65mg 大塚生食注 50mL	2 1	管 管	点滴	メイン	15分		フィルター付きラインは使用しない。
②		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	10分		
③	壊死起因性	パクリタキセル(アルブミン懸濁型) 大塚生食注 50mL	100 1	mg/m <sup>2</sup> 瓶	点滴	メイン	30分		
④		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	10分		
⑤		生食注シリンジ「NP」 10mL	1	筒	生食ロック	メイン			