

### 沖縄病院 化学療法レジメン登録票

**【Non-sq】Nivo(day1,22)+Ipi(day1)+CDDP(day1,22)+PEM(day1,22) 療法**

☆投与スケジュール									
※医薬品名・投与量・ルート・時間等を記載。前投薬や輸液なども投与順に具体的に記述する									
Day1と8で投与スケジュールが異なる、Day2, 3のHydrationがあるなど複数日に渡る場合は各々記載する									
【Day1】									
投与順	血管外漏出リスク	薬品名(一般名)	投与量	単位	投与経路	ルート	時間	速度	薬剤毎の注意点
①		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	15分		フィルター付きラインを使用
②	非壊死性	ニボルマブ 大塚生食注 100mL	360 1	mg/body 瓶	点滴	メイン	60分		全量100mLに調製
③		大塚生食注 100mL	1	瓶	点滴	メイン	30分		オブジーボ投与終了後30分 開けてヤーボイの投与を開始
④	非壊死性	イピリムマブ 大塚生食注 50mL	1 0.4	mg/kg 瓶	点滴	メイン	30分		生食20mLにヤーボイを混和
⑤		大塚生食注 500mL	1	袋	点滴	メイン	60分		
⑥		ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 1mEq/mL	1 0.4	袋 管	点滴	メイン	60分		
⑦		パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサメタゾン 1.65mg	1 4	袋 管	点滴	メイン	15分		※アプレピタントなしの場合 DEX d.i.v: 8~10Aに増量 [内服]アプレピタント: Day1~3 DEX4mg: 2錠2× Day2~4
⑧	非壊死性	ペトレキセド 大塚生食注 100mL	500 1	mg/m <sup>2</sup> 瓶	点滴	メイン	10分		
⑨		マンニトールS注射液 300mL	1	瓶	点滴	メイン	60分		
⑩	炎症性	シスプラチン 大塚生食注 500mL	75 1	mg/m <sup>2</sup> 袋	点滴	メイン	60分		全量500mLに調製
⑪		ソルデム3A 500mL	1	袋	点滴	メイン	90分		
⑫		大塚生食注 500mL	1	袋	点滴	メイン	90分		
⑬		フロセミド注20mg	1	管	静注	側管			
⑭		生食注シリンジ「NP」 10mL	1	筒	生食ロック				

【Day22】									
投与順	血管外漏出リスク	薬品名(一般名)	投与量	単位	投与経路	ルート	時間	速度	薬剤毎の注意点
①		大塚生食注 50mL	1	瓶	点滴	メイン	15分		フィルター付きラインを使用
②	非壊死性	ニボルマブ 大塚生食注 100mL	360 1	mg/body 瓶	点滴	メイン	60分		全量100mLに調製
③		大塚生食注 500mL	1	袋	点滴	メイン	60分		
④		ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液 1mEq/mL	1 0.4	袋 管	点滴	メイン	60分		
⑤		パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサメタゾン 1.65mg	1 4	袋 管	点滴	メイン	15分		※アプレピタントなしの場合 DEX d.i.v: 8~10Aに増量 [内服]アプレピタント: Day1~3 DEX4mg: 2錠2× Day2~4
⑥	非壊死性	ペムトレキセド 大塚生食注 100mL	500 1	mg/m <sup>2</sup> 瓶	点滴	メイン	10分		
⑦		マンニトールS注射液 300mL	1	瓶	点滴	メイン	60分		
⑧	炎症性	シスプラチン 大塚生食注 500mL	75 1	mg/m <sup>2</sup> 袋	点滴	メイン	60分		全量500mLに調製
⑨		ソルデム3A 500mL	1	袋	点滴	メイン	90分		
⑩		大塚生食注 500mL	1	袋	点滴	メイン	90分		
⑪		フロセミド注20mg	1	管	静注	側管			
⑫		生食注シリンジ「NP」 10mL	1	筒	生食ロック				

【Day2、3、23、24】									
	血管外漏出リスク	薬品名(一般名)	投与量	単位	投与経路	ルート	時間	速度	薬剤毎の注意点
①		大塚生食注 500mL	1	袋	点滴	メイン	90分		
②		ソルデム3A 500mL	1	袋	点滴	メイン	90分		
③		ソルデム3A 500mL	1	袋	点滴	メイン	90分		
④		生食注シリンジ「NP」 10mL	1	筒	生食ロック				