

沖縄病院 化学療法レジメン登録票

|                 |        |
|-----------------|--------|
| レジメンコード(事務局入力欄) | 110412 |
|-----------------|--------|

CDDP(80/D1)+VNR(20/D1.8)+RT/q4w

療法

| ★投与スケジュール   |              |                                     |          |                        |       |     |     |    |  |
|---|--------------|-------------------------------------|----------|------------------------|-------|-----|-----|----|--|
| ※医薬品名・投与量・ルート・時間等を記載。前投薬や輸液なども投与順に具体的に記述する                |              |                                     |          |                        |       |     |     |    |  |
| Day1と8で投与スケジュールが異なる、Day2, 3のHydrationがあるなど複数日に渡る場合は各々記載する |              |                                     |          |                        |       |     |     |    |  |
| 【Day1】  |              |                                     |          |                        |       |     |     |    |  |
| 投与順   | 血管外<br>漏出リスク | 薬品名(一般名)                            | 投与量      | 単位                     | 投与経路  | ルート | 時間  | 速度 | 薬剤毎の注意点  |
| ①   |              | 大塚生食注 500mL                         | 1        | 袋                      | 点滴    | メイン | 60分 |    |  |
| ②   |              | ソルデム3A 500mL<br>硫酸Mg補正液 1mEq/mL     | 1<br>0.4 | 袋<br>管                 | 点滴    | メイン | 60分 |    |  |
| ③   |              | パロノセトロンバッグ 0.75mg<br>デキサメタゾン 1.65mg | 1<br>6   | 袋<br>管                 | 点滴    | メイン | 15分 |    | ※イメドなしの場合<br>DEX d.i.v: 8~10Aに増量<br>[内服]イメド: Day1~3<br>DEX4mg: 2錠2× Day2~4 |
| ④   | 壊死起因性        | ビノレルピン<br>大塚生食注 100mL               | 20<br>1  | mg/m <sup>2</sup><br>管 | 点滴    | メイン |     |    | 全開投与<br>(10分以内で投与)   |
| ⑤   |              | マンニトールS注射液 300mL                    | 1        | 袋                      | 点滴    | メイン | 60分 |    |  |
| ⑥   | 炎症性          | シスプラチン<br>大塚生食注 500mL               | 80<br>1  | mg/m <sup>2</sup><br>袋 | 点滴    | メイン | 60分 |    | 全量500mLに調製   |
| ⑦   |              | ソルデム3A 500mL                        | 1        | 袋                      | 点滴    | メイン | 90分 |    |  |
| ⑧   |              | 大塚生食注 500mL                         | 1        | 袋                      | 点滴    | メイン | 90分 |    |  |
| ⑨   |              | フロセミド 20mg                          | 1        | 管                      | 静注    | 側管  |     |    |  |
| ⑩   |              | 生食注シリンジ「NP」 10mL                    | 1        | 筒                      | 生食ロック |     |     |    |  |
| 【Day2・3】  |              |                                     |          |                        |       |     |     |    |  |
| ①   |              | 大塚生食注 500mL                         | 1        | 袋                      | 点滴    | メイン | 90分 |    |  |
| ②   |              | ソルデム3A 500mL                        | 1        | 袋                      | 点滴    | メイン | 90分 |    |  |
| ③   |              | ソルデム3A 500mL                        | 1        | 袋                      | 点滴    | メイン | 90分 |    |  |
| ④   |              | 生食注シリンジ「NP」 10mL                    | 1        | 筒                      | 生食ロック |     |     |    |  |
| 【Day8】  |              |                                     |          |                        |       |     |     |    |  |
| ①   |              | 大塚生食注 100mL                         | 1        | 袋                      | 点滴    | メイン | 15分 |    |  |
| ②   | 壊死起因性        | ビノレルピン<br>大塚生食注 100mL               | 20<br>1  | mg/m <sup>2</sup><br>瓶 | 点滴    | メイン |     |    | 全開投与<br>(10分以内で投与)   |
| ③   |              | 大塚生食注 100mL                         | 1        | 筒                      | 点滴    | メイン | 15分 |    |  |
| ④   |              | 生食注シリンジ「NP」 10mL                    | 1        | 筒                      | 生食ロック |     |     |    |  |