

シスプラチン・ペメトレキセド・タグリッソ day1
(アリムタ)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で8つです。点滴時間は約7時間40分です。

ソルデム3A 500mL
+硫酸Mg補正液

硫酸Mgはシスプラチンによる腎臓への副作用を予防する作用があります。

(1時間)

生食注 500mL

(1時間)

デキサメタゾン注
+ホスネツピタント注
+パロノセトロン点滴静注バック

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

(30分)

生食注 100mL
+ペメトレキセド注 _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(10分)

マンニトールS 300mL

利尿作用のあるお薬です。

(1時間)

生食注 500mL
+シスプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

(1時間)

ソルデム3A 500mL

(1時間30分)

生食注 500mL

(1時間30分)

フロセミド注

利尿作用のあるお薬です。


day 2,3

点滴の数は全部で3つです。点滴時間は約4時間30分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分			
シスプラチン注	抗がん剤です	60分			
タグリッソ	抗がん剤です	内服薬			



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11
より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。