

主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11
より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

カルボプラチン・ペメトレキセド・皮下アミバンタマブ
 (アリムタ) (リプロファス)
 1コース目 day8.15

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で1個です。点滴時間は約5分です。

アミバンタマブ皮下注 2400 mg


治療のお薬です。
 ※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



(5分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール


薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目
ペメトレキセド	抗がん剤です	10分							
カルボプラチン	抗がん剤です	1時間30分							
アミバンタマブ皮下	抗がん剤です	5分							



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11 より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11
より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

カルボプラチン・ペメトレキセド・皮下アミバンタマブ
 (アリムタ) (リプロファス)
 1コース目 day8.15

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で1個です。点滴時間は約5分です。

アミバンタマブ皮下注 3360 mg


治療のお薬です。
 ※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



(5分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目
ペメトレキセド	抗がん剤です	10分							
カルボプラチン	抗がん剤です	1時間30分							
アミバンタマブ皮下	抗がん剤です	5分							



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11 より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。