

主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11
より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

カルボプラチン・ペメトレキセド・皮下アミバンタマブ

(アリムタ)

(リプロファス)

2.3.4コース目 day1

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で5個です。点滴時間は約2時間45分です。

デキサメタゾン注
+グラニセトン点滴静注バック
+アロカリス点滴静注
+ファモチジン静注

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (30分)

生食注 100mL
+ペメトレキセド注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (10分)

生食注 250mL
+カルボプラチン注 _____ mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (1時間30分)

生食注 50mL

↓ (30分)


アミバンタマブ皮下注 3360 mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (5分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目
ペメトレキセド	抗がん剤です	10分	📌						
カルボプラチン	抗がん剤です	1時間30分	📌						
アミバンタマブ皮下	抗がん剤です	5分	📌						



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11 より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。