

### 主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11  
より改変)

- \* 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

維持ペメトレキセド・皮下アミバンタマブ  
 (アリムタ) (リプロファス)  
 5コース目以降 day1

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で4個です。点滴時間は約45分です。

デキサメタゾン注  
+ファモチジン静注

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。

↓ (15分)

生食注 100mL  
+ペメトレキセド注          mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (10分)

生食注 50mL

↓ (15分)


アミバンタマブ皮下注 3360 mg

治療のお薬です。  
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。

↓ (5分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目
ペメトレキセド	抗がん剤です	10分	☺						
アミバンタマブ皮下	抗がん剤です	5分	☺						



### 主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11  
より改変)

\*上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

\*副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。

\*注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。

\*何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。