

皮下アミバンタマブ・ラゼルチニブ

(リプロファス)

(ラスクルース)

1コース目 day1

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で2個です。点滴時間は約35分です。

生食注 50mL
+デキサメタゾン注
+ファモチジン静注

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬で



(30分)

アミバンタマブ皮下注 1600 mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい




(5分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	1日目	8日目	...
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					

薬の名前	作用	15日目	...	22日目	...	28日目
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, より)

* 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

* 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。

* 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。

* 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

皮下アミバンタマブ・ラゼルチニブ
 (リプロファス) (ラズクルース)
 1コース目 day1

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で2個です。点滴時間は約35分です。

生食注 50mL
 +デキサメタゾン注
 +ファモチジン静注

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬で




アミバンタマブ皮下注 2240 mg

治療のお薬です。
 ※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	1日目	8日目	...
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					
薬の名前	作用	15日目	...	22日目	...	28日目
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, より)

*上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

*副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。

*注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。

*何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

皮下アミバンタマブ・ラゼルチニブ

(リプロファス)

(ラズクルース)

1コース目 day8.15.22

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で1個です。点滴時間は約5分です。

アミバンタマブ皮下注 1600 mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい




(5分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	1日目	8日目	...
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					

薬の名前	作用	15日目	...	22日目	...	28日目
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, より)

* 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

* 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。

* 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。

* 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

皮下アミバンタマブ・ラゼルチニブ
(リプロファス) (ラズクルース)
1コース目 day8.15.22

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で1個です。点滴時間は約5分です。

アミバンタマブ皮下注 2240 mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい




(5分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	1日目	8日目	...
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					

薬の名前	作用	15日目	...	22日目	...	28日目
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, より)

*上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

*副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。

*注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。

*何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。