

皮下アミバンタマブ・ラゼルチニブ
(リプロファス) (ラスクルース)
2コース目以降 day1.15

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で1個です。点滴時間は約5分です。

アミバンタマブ皮下注 1600 mg

治療のお薬です。


※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい



(5分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	1日目	...	15日目	...	28日目
アミバンタマブ皮下	抗がん剤	👤		👤		
ラゼルチニブ	抗がん剤	🟠	🟠	🟠	🟠	🟠



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, より)

* 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

* 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。

* 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。

* 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

皮下アミバンタマブ・ラゼルチニブ

(リプロファス)

(ラスクルーズ)

2コース目以降 day1.15

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で1個です。点滴時間は約5分です。

アミバンタマブ皮下注 2240 mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい




(5分)



お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	1日目	...	15日目	...	28日目
アミバンタマブ皮下	抗がん剤					
ラゼルチニブ	抗がん剤					



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, より)

*上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

*副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。

*注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。

*何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。