


カルボプラチン・アブラキサン・タブレクタ day1


氏名 様 月 日

点滴の数は全部で6つです。点滴時間は約3時間5分です。



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目
アブラキサン	抗がん剤です	30分	☐		☐		☐		
カルボプラチン	抗がん剤です	1時間30分	☐						
タブレクタ	抗がん剤です	内服薬	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11 より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

アブラキサン・タブレクタ

氏名
 様
 月
 日

点滴の数は全部で4つです。点滴時間は約1時間5分です。

デキサート注
+生食注 50ml

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。




生食注 50ml



生食注 50ml
+アブラキサン mg

治療のお薬です。
※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。




生食注 50ml



😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目
アブラキサン	抗がん剤です	30分	☑		☑		☑		
カルボプラチン	抗がん剤です	1時間30分	☑						
タブレクタ	抗がん剤です	内服薬	○	○	○	○	○	○	○



主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011. 1より改)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。