

カルボプラチン・ペメトレキセド・ペムブロリズマブ (アリムタ) (キイトルーダ)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で7つです。点滴時間は約3時間25分です。

生食注 50mL



(15分)

生食注 100mL
+ ペムブロリズマブ注 100 mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



(30分)

生食注 50mL



(15分)

デキサメタゾン注
+ ホスネツピタント注
+ グラニセトロンバッグ

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。



(30分)

生食注 100mL
+ ペメトレキセド注 mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



(10分)

生食注 250mL
+ カルボプラチン注 mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



(1時間30分)


生食注 50mL



(15分)

😊 お薬の名前と治療のスケジュール

薬の名前	作用	目安の時間	1日目	...	21日目
ペムブロリズマブ注	抗がん剤です	30分	☑		
ペメトレキセド注	抗がん剤です	10分	☑		
カルボプラチン注	抗がん剤です	1時間30分	☑		




主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11
より改変)

- * 上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。
- * 何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

免疫チェックポイント阻害薬の 気を付けていただきたい症状一覧



特に下線を引いた症状が発現した場合は、すぐにお知らせください。