

# ペメトレキセド・ペムブロリズマブ (アリムタ) (キイトルーダ)

氏名 様 月 日

点滴の数は全部で6回です。点滴時間は約1時間40分です。

生食注 50mL



(15分)

生食注 100mL  
+ **ペムブロリズマブ注 100 mg**

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



(30分)

生食注 50mL



(15分)

生食注 50mL  
+ デキサメタゾン注

治療によるアレルギー症状や吐き気等の症状を予防するお薬です。



(15分)

生食注 100mL  
+ **ペメトレキセド注** mg

治療のお薬です。

※気分が悪い・呼吸が苦しい等ありましたら、お知らせ下さい。



(10分)

生食注 50mL




(15分)



## お薬の名前と治療のスケジュール

| 薬の名前      | 作用     | 目安の時間 | 1日目 | ... | 21日目 |
|-----------|--------|-------|-----|-----|------|
| ペムブロリズマブ注 | 抗がん剤です | 30分   | ☑   |     |      |
| ペメトレキセド注  | 抗がん剤です | 10分   | ☑   |     |      |



### 主な抗がん薬の副作用と発現時期の目安

(インフォームドコンセントのための図説シリーズ 抗悪性腫瘍薬 肺がん 改訂版, 2011, p11  
より改変)

\*上の図は副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

\*副作用が出現した際には、必要に応じてお薬を使うこともあります。

\*注射部位に違和感や浮腫、痛みなどありましたら、すぐにお知らせください。

\*何か気になる症状がありましたら、すぐにお知らせください。

# 免疫チェックポイント阻害薬の 気を付けていただきたい症状一覧



特に下線を引いた症状が発現した場合は、すぐにお知らせください。